

遠隔インタラクティブ講義

2016年11月22日

「計算生命科学の基礎（III）」


# QM/MM法による タンパク質機能解析

広島市立大学大学院情報科学研究科

鷹野 優



*ytakano@hiroshima-cu.ac.jp*




# 概要


- I. 序論
- II. QM/MMの理論
- III. 金属タンパク質中の補欠分子の電子構造
  - III-1. 暗所作動型プロトクロロフィリド還元酵素 (DPOR) 中の [4Fe-4S] クラスター
  - III-2. 光合成反応中心のスペシャルペア
- IV. Photoactive Yellow Proteinに現れるH/D同位体効果の理論的解析
- V. 生体高分子生化学的機能解析のための分子計算技術の開発
  - V-1. 半経験的分子軌道法によるQM部分の高速化
  - V-2. 超並列QM/MM-MD連成計算プログラム Platypus
- VI. まとめ
  - タンパク質は活性中心固有の性質を強める

# I. 序論


タンパク質は、個々に  
いろいろな機能を持つ



抗体




酵素



光合成  
活性中心



受容体



細胞内


# Our goal

## 構造機能相関

分子構造  $\xrightarrow{\text{分子のかたち  
電荷分布  
軌道相互作用}}$  機能

(例) Croタンパク質

DNAと強く結合し、RNAポリメラーゼによる転写を邪魔します




タンパク質がDNAを認識する

赤：負電荷  
青：正電荷

# Our goal


分子構造—電子構造—機能相関





分子構造・電子構造は機能発現を  
どのように制御しているか？

# タンパク質の電子構造

- 1) タンパク質は巨大で、ヘテロで、ダイナミックな系
- 2) タンパク質の機能の発揮は局所部位の電子状態に依存する



タンパク質のつくる電場




[文献 2: Sakuma et al.  
(1997) Int. J. Quantum  
Chem. 61, 137]

光合成反応中心

タンパク質のつくる環境は電子構造に影響

# タンパク質の電子構造

- 1) タンパク質は巨大で、ヘテロで、ダイナミックな系
- 2) タンパク質の機能の発揮は局所部位の電子状態に依存する



HIV-1 プロテアーゼ  
黄色・オレンジ: アポ体  
緑・青: 薬物との複合体

はたらく時には形が変わる。



タンパク質のうごき(ダイナミクス)は電子構造に影響


# タンパク質の電子構造

- 1) タンパク質は巨大で、ヘテロで、ダイナミックな系
- 2) タンパク質の機能の発揮は局所部位の電子状態に依存する



活性中心そのもの  
活性中心をとりかこむタンパク質  
溶質分子をとりかこむ溶媒分子  
アンサンブル  
ダイナミクス

計算サイズ  
小



大

資源（計算機・人間の能力）には限りがある



「どのようにしてモデル化するか？」

# タンパク質の電子構造

## モデル化の功罪

功：計算量の減少

系の単純化

罪：情報の欠損



資源の分配をどうするか

なにを理解したいのか？





賢いモデルの選択は本質の理解に必須

# タンパク質の電子構造

- 1) タンパク質は巨大で、ヘテロで、ダイナミックな系
- 2) タンパク質の機能の発揮は局所部位の電子状態に依存する



## QM/MM法の適用




Photoactive Yellow Protein

## **II. QM/MMの理論**

# QM/MM法


- ・多階層連結計算法の一つ
- ・電子構造が重要な部分（化学反応）は量子力学(QM)を  
それ以外は分子力場(MM)を用いる
- ・1976年にWarshelとLevittが提案
- ・2013年ノーベル賞（Warshel, Levitt, Karplus）



[http://www.nobelprize.org/nobel\\_prizes/chemistry/laureates/2013/popular-chemistryprize2013.pdf](http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2013/popular-chemistryprize2013.pdf)

# QM/MM法

- ・全系(System)をQM領域(Inner)とMM領域(Outer)に分割
- ・QMとMMの境界に共有結合が含まれる場合は  
特別な取り扱いが必要



**System = Inner + Outer + (Link)**

共有結合

# QM/MM法を使う計算手法

- 基本的に制限はない

QM: 密度汎関数法(DFT)

Hartree-Fock法(HF)

post-HF法(MP2, CASSCFなど)

半経験的分子軌道法 (AM1, PM6法など)

MM: AMBER

CHARMM

GROMOS


OPLS-AA

# QM/MM法の種類

全系のエネルギーの表現法に関して大きく二種類ある


## 減法表現 (ONIOM法)

$$E_{\text{QM/MM}}^{\text{sub}}(\text{System}) = E_{\text{MM}}(\text{System}) + E_{\text{QM}}(\text{Inner+Link}) - E_{\text{MM}}(\text{Inner+Link})$$



## 加法表現 (QM/MM法)

$$E_{\text{QM/MM}}^{\text{add}}(\text{System}) = E_{\text{MM}}(\text{Outer}) + E_{\text{QM}}(\text{Inner+Link}) + E_{\text{QM/MM}}(\text{Inner,Outer})$$



# タンパク場の効果

## mechanical embedding

QMの電子密度はMMと相互作用しない

Steric effectのみ考慮

## electrostatic embedding

QMのハミルトニアンにMMとの静電相互作用をとりこむ

Electrostatic effectとSteric effectを考慮

MMの電荷がQM領域に近いときには過分極を起こす

→ • 電荷スケーリング法

QM境界付近のMM電荷の大きさを調整

• 電荷シフト法

QM境界付近のMM電荷をより外の原子にシフトする

• ガウス型電荷分布

# QM/MM境界問題

QM/MM境界に化学結合が存在する場合

QM空間の切斷->不対電子対の発生->QM（分子軌道）の歪み



正しいエネルギー及び力が得られない


1. どのように切るか？
2. どこを切るか？

# QM/MM境界問題

## 1. どのように切るか？


### (1)Link atom method

QM領域とMM領域の境界にある  
化学結合の末端を水素原子などで  
置き換える



### (2)局在化軌道法

QM領域とMM領域の境界にある  
化学結合を局在化軌道(SLBOs)を  
用いて表現する。



# QM/MM境界問題

## 2. どこを切るか？

### (1) 経験的、化学的洞察

活性中心から遠方の領域を選択  
 $sp^3$ 炭素で切る

### (2) 線形応答関数解析

QM/MMモデル化に起因する  
QM領域の電子構造の誤差の最小化

$$\boxed{\delta\rho(\mathbf{r})} = \int \frac{\delta\rho(\mathbf{r}')}{\delta v(\mathbf{r}')} \delta v(\mathbf{r}') d\mathbf{r}'$$

# 線形応答関数解析


従来：QM/MMモデルによる誤差  $\delta v(r')$  の最小化

QM/MMモデル由来のQM領域の誤差  $\delta \rho(r)$  の最小化

## [ガイドライン]

- (i) 共有結合では電子トランスファーが大きい平衡核間距離では結合不安定が起こる(結合が切れかけた)状態で最大となる。
- (ii) トランスファーブロックがない状況ではサイト数が多くなるにつれフリーデル振動型の振動・減衰となる。
- (iii) アラニンジペプチド, グルタチオン, アラニントリペプチド系ではsp<sup>3</sup>接合点が伝播をブロックする。水素結合経由の伝播は約0.001(ex. 0.1 Hartreeの  $\delta v(r')$  に対し0.0001の誤差伝播)。  
 $\alpha$ ヘリックス系では明白に誤差伝播が構造化される(右図)。

従来のsp<sup>3</sup>接合点での切断が有効



QM/MM境界問題の定量化が可能に！

# QM/MM法による構造最適化

計算コスト

QM > QM/MM >> MM



## microiterative scheme

QM部分とMM部分の構造最適化に異なるアルゴリズムや座標系を使う

QM: macroiteration (内部座標+擬ニュートンアルゴリズム)

MM: microiteration (カーテシアン座標+共役勾配法)

## 構造最適化の手続き

### (1) 断熱アプローチ

QMのmacroステップではMM環境は完全に構造最適化される

### (2) 交互スキーム

QMとMMの構造最適化は交互に行われる

### **III. 金属タンパク質中の補欠分子**

# 生物と金属

バランスを保つことで生物の生命維持に必須のはたらきをする

多量	微量	超微量
Na	Fe	Ni
K	Zn	Cr
Mg	Cu	Co
Ca	Mn	Mo
	V	W




呼吸・光合成・窒素固定


どのように金属と生体分子が相互作用（制御）しているか？

# 金属をもつ生体分子の特徴 (環境にやさしい触媒)


例：窒素（反応しにくい安定な気体）からアンモニアを生成



- ・ハーバー・ボッシュ法



- ・ニトロゲナーゼ（鉄：Fe, モリブデン：Mo）




金属タンパク質の機能発現機構？


# 金属補欠分子

タンパク質の生物活性において重要な、タンパク質に結合する非タンパク質


活性中心として機能を発現する




ヘム (Fe)



酸素発生複合体(Mn)



スペシャルペア (Mg)



[4Fe-4S]クラスター (Fe)

# Inside-out アプローチ


1. 金属補欠分子固有の電子構造を調べる
2. タンパク質中の電子構造を調べる
3. 1と2を比較する




**static effects (構造歪み、静電相互作用)**  
**dynamic effects (ゆらぎ)**

(例) シトクロムc酸化酵素のヘム *a* in CcO

タンパク質なし



タンパク質あり



Takano and Nakamura,  
J. Comput. Chem. (2010)


タンパク質は電荷移動  
を強める

PropAの電荷変化が  
プロトン移動のトリガー

increase of charge density

decrease of charge density

# 遷移金属と生体分子の相互作用



軌道・電荷・スピノンが協同的に影響しあう  
→ 理論的取り扱いが非常に困難


# 強相関電子系

金属イオンの電子間にはたらく強いクーロン反発相互作用



さまざまな電子配置・電子相関を考慮にいれないといけない

(例) 酸素発生複合体 ( $Mn_4CaO_5$  クラスター)



可能な電子配置数


Mnの3d軌道  
Oの2p軌道



約100京通り！

*ab initio* DMRG法で可能になった

# Density Functional Theory (DFT)



厳密な交換相関汎関数はわからない

$E_{Ts}$  : kinetic energy of non-interacting system

$E_{XC}$  : exchange-correlation energy

# Exchange-Correlation Energy

The exchange-correlation energy has the form:

$$E_{XC} = \boxed{(E_T - E_{Ts})} + \boxed{(E_{EE} - E_J)}$$

Correction of electron-electron interaction  
Correction of kinetic energy

DFTの精度は交換相関汎関数項に依存する

# DFTの利点

**Excellent performance-to-cost ratio !**

**performance** ex. Mean absolute error of heat of formation  
for the G2 dataset (kcal/mol)

DFT 3.0 (B3LYP), 7.1(BLYP), 90.8 (SVWN)

HF 149.2

MP2 23.8

CC 11.5

**cost** ex. Benzene ( $C_6H_6$ ) single point

DFT  $O(N^3) \sim O(N^4)$  1 min 38 sec (SVWN), 2 min 20 sec (BLYP)

HF  $O(N^4)$  1 min 48 sec

MP2  $O(N^5)$  2 min 36 sec

CC  $O(N^7)$  2 hours 29 min 20 sec

Xu, X. and Goddard III, W. A. , *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* **2004**, *101*, 2673-2677.  
Jensen, F. *Introduction to Computational Chemistry*, 2nd ed. Wiley (2007)

# DFTの欠点

## **Obscure systematic improvability**

There is **not clear path to the exact solution** of the Schrödinger eq., since DFT show very good accuracy for a wide range of applications due to **the error cancellation**.




**DFTの交換相関汎関数のチェックが必要！  
(特に遷移金属系)**

# III-1. 暗所作動型プロトクロロフィリド 還元酵素 (DPOR) 中の [4Fe-4S] クラスター


Takano, Y.; Yonezawa, Y.; Fujita, Y.; Kurisu, G.; Nakamura, H. *Chem. Phys. Lett.* **2011**, *503*,  
296–300.

# DPOR



クロロフィルの生合成にかかる酵素




Stereo-specific reduction of  
C17=C18 double bond



Dark-operative protochlorophyllide  
oxidoreductase (DPOR)






# DPORの変わった[4Fe-4S]クラスター




chelated by the carboxylate group of Asp36

# 酵素活性






D36C: almost no activity




How is the Asp ligation involved in  
the enzyme activity?

# 酵素活性



D36A: small activity (13 %)



What is the fourth ligand?

# 問題

**Q1: How does the Asp ligation affect the electronic structure of the [4Fe-4S] cluster?**


**Q2: What is the fourth ligand of the [4Fe-4S] cluster in the D36A mutant?**

**Q3: How does DPOR affect the electronic structure of the NB cluster?**



**Quantum chemical calculations  
QM/MM calculation**

# Model



Electronic states:

$[\text{Fe}_4\text{S}_4(\text{SCH}_3)_3\text{R}]^{1-}$  ( $\text{Fe}^{\text{III}}_3\text{Fe}^{\text{II}}_1$ )

$[\text{Fe}_4\text{S}_4(\text{SCH}_3)_3\text{R}]^{2-}$  ( $\text{Fe}^{\text{III}}_2\text{Fe}^{\text{II}}_2$ )

$[\text{Fe}_4\text{S}_4(\text{SCH}_3)_3\text{R}]^{3-}$  ( $\text{Fe}^{\text{III}}_1\text{Fe}^{\text{II}}_3$ )

( $\text{R} = \text{CH}_3\text{COO}^-$ ,  $\text{SCH}_3^-$ ,  $\text{OH}^-$ , and  $\text{Cl}^-$ )

# 交換相関汎関数の選択

Niu, S.; Nichols, J. A.; Ichiye, T. *J. Chem. Theory Comput.* **2009**, 5, 1361-1368

Computation of the vertical and adiabatic detachment energies for  $[\text{Fe}(\text{SCH}_3)_4]^{2-/1-/0}$  and  $[\text{Fe}(\text{SCH}_3)_3]^{1-/0}$

*"B3LYP gives the best balance of accuracy in energy and geometry and is comparable to coupled cluster methods."*

*"Addition of diffuse functions to only the sulfur significantly improves the energies."*

Szilagyi, R. K.; Winslow, M. A. *J. Comput. Chem.* **2006**, 27, 1385-1397

Computation of the atomic spin densities for  $[\text{Fe}_4\text{S}_4(\text{SEt})_4]^{2-}$  and  $[\text{Fe}_2\text{S}_2(\text{SEt})_4]^{2-}$

*"The most reasonable agreement for atomic spin densities is obtained by a hybrid functional 5 % HF exchange and 95% P86."*

*"The basis set seems to saturate only at the triple-zeta level with polarization and diffuse functions."*

# Methods

計算方法

**UB3LYP**

基底関数

エネルギー計算

**Fe: wachters + f**

**C, N, O, H: 6-311++G(df,pd)**

構造最適化、振動解析

**Fe, C, N, O, H: 6-31G(d,p)**

電子状態

**total charge**

- 1:  $[\text{Fe}^{\text{III}}_3 \text{Fe}^{\text{II}}_1]$
- 2:  $[\text{Fe}^{\text{III}}_2 \text{Fe}^{\text{II}}_2]$
- 3:  $[\text{Fe}^{\text{III}}_1 \text{Fe}^{\text{II}}_3]$

タンパク質環境

**Polarizable continuum model ( $\epsilon = 4.0, 10.0, (\text{protein}) \text{ and } 37.0 \text{ (DMF)}$ )**


# 可能な電子配置

$[\text{Fe}_4\text{S}_4(\text{SCH}_3)_3\text{R}]^{1-}$  :  $\begin{matrix} {}_5\text{C}_1 \\ \times \end{matrix}$  = 15 combinations


$[\text{Fe}_4\text{S}_4(\text{SCH}_3)_3\text{R}]^{2-}$  :  $\begin{matrix} ({}_5\text{C}_1)^2 \\ \times \end{matrix}$  = 450 combinations

$[\text{Fe}_4\text{S}_4(\text{SCH}_3)_3\text{R}]^{3-}$  :  $\begin{matrix} ({}_5\text{C}_1)^3 \\ \times \end{matrix}$  = 1500 combinations


Which d orbital is doubly occupied?



Which the Fe sites are Fe<sup>II</sup> ions?




Which the Fe sites have up spin?



# 交換相関汎関数の選択

◆実験値（イオン化ポテンシャルと酸化還元電位）との比較



D36C model  $[\text{Fe}_4\text{S}_4(\text{SCH}_3)_4]$

Ionization Potential,  $IP$

$$IP(1-/2-)_{\text{calc}} = \mathbf{0.29} \text{ eV}$$

$$IP(1-/2-)_{\text{exp}} = \mathbf{0.29 \pm 0.10} \text{ eV } (^{\text{a}}[\text{Fe}_4\text{S}_4(\text{SC}_2\text{H}_5)_4])$$

Redox Potential  $E^0$

$$E^0(1-/2-)_{\text{calc}} = \mathbf{-0.068} \text{ eV (DMF (PCM, } \epsilon = 37.0))$$

$$E^0(1-/2-)_{\text{exp}} = \mathbf{0.1} \text{ eV } (^{\text{b}}[\text{Fe}_4\text{S}_4(\text{S}(t\text{-Bu}))_4] \text{ in DMF})$$

$$E^0(2-/3-)_{\text{calc}} = \mathbf{-0.79} \text{ eV } (\text{DMF (PCM, } \epsilon = 37.0))$$

$$E^0(2-/3-)_{\text{exp}} = \mathbf{-1.05} \text{ eV } (^{\text{c}}[\text{Fe}_4\text{S}_4(\text{SCH}_3)_4] \text{ in DMF})$$



The computational procedure reproduces the experimental redox potentials.

<sup>a</sup>Wang, X.-B.; Niu, S.; Yang, X.; Ibrahim, S. K.; Pickett, C. J.; Ichijo, T.; Wang, L.-S. *J. Am. Chem. Soc.* **2003**, *125*, 14072-14081

<sup>b</sup>Mascharak, P. K.; Hagen, K. S.; Spence, J. T.; Holm, R. H. *Inorg. Chim. Acta* **1983**, *80*, 157-170

<sup>c</sup>DePamphilis, B. V.; Averill, B. A.; Herskovits, T.; Que, L., Jr.; Holm, R. H. *J. Am. Chem. Soc.* **1974**, *96*, 4159-4167

# Redox potential



# Electron-donating character


state	$\epsilon$	electron-donating character
	$\epsilon = 4.0$	
<b>1-/2-</b>	$\epsilon = 10.0$	D36A_OH > D36C > D36A_Cl > NB cluster
	$\epsilon = 37.0$	
	$\epsilon = 4.0$	D36A_OH > D36A_Cl > D36C > NB cluster
<b>2-/3-</b>	$\epsilon = 10.0$	D36A_OH > D36A_Cl > NB cluster > D36C
	$\epsilon = 37.0$	D36A_OH > NB cluster > D36A_Cl > D36C

In the 2-/3- reduction reaction, in a hydrophilic environment


**NB cluster** → a better electron-donor

# Comparison to other [4Fe-4S] proteins


HiPIP (**1-**/**2-**)



Ferredoxin (**2-**/**3-**)



DPOR (?)



2 H-bonds and 0 water

7 H-bonds and 1 water

8 H-bonds and 2 water

In DPOR, the [4Fe-4S] cluster would be exposed in a **high dielectric environment** and reduced **from the 2- to 3- oxidation states**.

# Electron-donating character in DPOR


state	$\epsilon$	electron-donating character
	$\epsilon = 4.0$	
<b>1-</b> / <b>2-</b>	$\epsilon = 10.0$	D36A_OH > D36C > D36A_Cl > NB cluster
	$\epsilon = 37.0$	
	$\epsilon = 4.0$	D36A_OH > D36A_Cl > D36C > NB cluster
<b>2-</b> <b>3-</b>	$\epsilon = 10.0$	D36A_OH > D36A_Cl > <b>NB cluster</b> > <b>D36C</b>
	$\epsilon = 37.0$	D36A_OH > <b>NB cluster</b> > <b>D36A_Cl</b> > <b>D36C</b>

DPOR

**NB cluster** → a better electron-donor


**Cl<sup>-</sup> ion** → the fourth terminal ligand of the D36A mutant

# Effects of protein environment



# Effects of protein environment

## Redox potential ( $\varepsilon = 10.0$ )



## DPOR enhances the electron-donating character of the NB cluster

# まとめ

Q1: How does the Asp ligation affect the electronic structure of the [4Fe-4S] cluster?

A1: **The Asp ligation to the [4Fe-4S] cluster provides a better electron-donating character.**

→ Reduction of the protochlorophyllide in DPOR

Q2: What is the fourth ligand of the [4Fe-4S] cluster in the D36A mutant?

A2: Redox potential and enzyme activity

→ A **Cl<sup>-</sup> ion** is more likely to be **the fourth terminal ligand to the [4Fe-4S] core of the D36A mutant** than an OH<sup>-</sup> ion.

Q3: How does DPOR affect the electronic structure of the NB cluster?

A3: The structural distortion and electrostatic interactions of DPOR **enhance the electron-donating character of the NB cluster.**


## III-2. 光合成反応中心スペシャルペア

Yamasaki, H.; Nakamura, H.; Takano, Y. *Chem. Phys. Lett.* **2007**, *447*, 324–329

Yamasaki, H.; Takano, Y.; Nakamura, H. *J. Phys. Chem. B* **2008**, *112*, 13923–13933


# 光合成

植物などの光合成色素をもつ生物がおこなう、  
光エネルギーを化学エネルギーに変換する生化学反応




光合成電子伝達反応  
(明反応) + 炭素固定反応  
(暗反応)

# 光合成電子伝達反応（明反応）



数々のタンパク質複合体により構成されている


# 光化学系



反応中心: 光エネルギーを電子エネルギーに変換


# 光合成反応中心

光エネルギーを電子エネルギーに変換  
(量子収率  $> 0.8$ )




# 光合成反応中心

光エネルギーを電子エネルギーに変換



色素が疑似二回対称性を持つにもかかわらず  
電子移動経路は一方向

# スペシャルペアカチオンラジカルの スピニン密度



スペシャルペアカチオンラジカルのスピニン密度は非対称


# 目的

スペシャルカチオンラジカルの  
スピニン密度の非対称性の原因は何か？



光合成反応中心の非対称な電子移動

# タンパク場の効果




- スピン密度の偏りが再現された
- スペシャルペア単体でもスピン密度に偏りが生じている
- タンパク質の静電相互作用がスピン密度の非対称性が強める

Yamasaki, H.; Nakamura, H.; Takano, Y. *Chem. Phys. Lett.* **2007**, *447*, 324–329



[QM]方法:UB3LYP 基底関数6-31G(d)(0.25) [MM] AMBER96

# 側鎖の影響




Mes基とPhyt基の配向の違いにより  
スペシャルペアの電子構造の非対称性が生じた


# 側鎖の影響



# Mes基とPhyt基の配向が異なる




# 配向の違いは保存されている




1aig

*Rhodobacter  
sphaeroides*




2i5n

*Rhodopseudomonas  
viridis*



1eys

*Thermochro-  
matium tepidum*




2axt

*Thermosynecho-  
coccus elongatus*

Purple bacteria


Cyanobacteria

# タンパク質環境が配向の違いを与える




4つの結晶構造の重ね合わせでは、  
Mes基とPhyt基のまわりはよく重なっている

# 配向の違いを与えるアミノ酸残基は保存されている



# 配向の違いを与えるアミノ酸残基は保存されている



Mes基とPhyt基の配向を決めるアミノ酸残基は  
よく保存されている

# NMRによる検証

J|A|C|S  
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

Article

[pubs.acs.org/JACS](https://pubs.acs.org/JACS)

## Symmetry Break of Special Pair: Photochemically Induced Dynamic Nuclear Polarization NMR Confirms Control by Nonaromatic Substituents

Karthick Babu Sai Sankar Gupta,<sup>†</sup> A. Alia,<sup>†,§</sup> Huub J.M. de Groot,<sup>†</sup> and Jörg Matysik\*,<sup>†,‡</sup>


<sup>†</sup>Institute of Chemistry, Leiden University, P.O. Box 9502, 2300 RA Leiden, The Netherlands

<sup>‡</sup>Institut für Analytische Chemie, Universität Leipzig, Linnéstr. 3, 04104 Leipzig, Germany

<sup>§</sup>Institut für Medizinische Physik und Biophysik, Universität Leipzig, Härtelstraße 16-18, 04107 Leipzig, Germany

### Supporting Information

**ABSTRACT:** Despite the high structural symmetry of cofactor arrangement and protein environment, light-induced electron transfer in photosynthetic reaction centers (RCs) of the purple bacterium *Rhodobacter sphaeroides* runs selectively over one of the two branches of cofactors. The origin of this functional symmetry break has been debated for several decades. Recently, a crucial role of the substituents has been proposed by theoretical studies [Yamasaki, H.; Takano, Y.; Nakamura, H. *J. Phys. Chem. B* 2008, 112, 13923–13933]. Photo-CIDNP (photochemically induced dynamic nuclear polarization) MAS (magic angle spinning) NMR demonstrates that indeed the peripheral atoms show opposite electronic effects on both sides of the special pair. While the aromatic system of  $P_L$  receives electron density from its periphery, the electron density of the aromatic ring of  $P_M$  is decreased.



# まとめ


1. Mes基とPhyt基の配向の違いがスペシャルペアの電子構造の非対称性を引き起こした
2. タンパク質の静電相互作用がスピン密度の非対称性を強めた
3. Mes基とPhyt基の配向を決める配列は保存されていた

# **IV. Photoactive Yellow Proteinに 現れる H/D同位体効果の理論的解析**

# H/D同位体効果（同位体シフト）

重水素置換によって分子の構造や  
分光スペクトルに生じる微小変化


Geometry



$$R(OH) = 0.990$$

$$R(OD) = 0.985$$

Absorption spectrum



原子核の量子揺らぎの違いを反映  
電子状態の量子化学計算だけでは解析不能

# H/D同位体効果の理論解析手法： Multi-Component Quantum Mechanics (MC\_QM)

## ▼理論概説

### ① 拡張された Hamiltonian

$$\hat{H}_{\text{MC}} = \hat{H}_e + \hat{T}_p + \hat{V}_{e-p}$$

電子の Hamiltonian  
水素原子核の 運動エネルギー  
核-電子相互作用

### ② 拡張された 波動関数

$$\Psi = |\Psi\rangle^e \otimes \prod_i \varphi_i^p$$

電子の波動関数 (Slater行列式)      水素の 波動関数

### ③ 拡張された LCAO-SCF 方程式

$$\mathbf{FC} = \mathbf{SC}\varepsilon$$

電子の Fock 演算子:

$$f_0^e = h^e + \sum_j 2J_j^e + V^{\text{XC}(e-e)} - \sum_k J_k^p$$


水素の Fock 演算子:

$$f_0^p = h^p + \sum_{l \neq k} J_l^p - \sum_j J_j^e$$

✓ 電子と水素原子核の量子状態を同時に決定

# H/D同位体効果の理論解析手法： Multi-Component Quantum Mechanics (MC\_QM)


## ▼特色





- ✓ MC\_QMは効率的に構造と分光スペクトルに現れるH/D同位体効果を解析可能

# Photoactive Yellow Protein (PYP)

好塩光合成細菌 *H. halophila* の負の走光性を制御



## 発色団の光異性化 (パラクマル酸: pCA)





プロトン移動共役  
シグナル伝達?

# Photoactive Yellow Protein (PYP)

## ▼ 結晶構造解析



- ① 低障壁水素結合 (LBHB) が存在
- ② 近隣のArg52が脱プロトン化



# Photoactive Yellow Protein (PYP)

## ▼ 理論解析



- ① 一般的な水素結合が存在
- ② 近隣のArg52がプロトン化



✓ 実験・理論で異なる描像を提示



# 目的

MC\_QM法を用いた解析により、H/D同位体効果  
という観点からpCAとGlu46の間の水素結合と、  
Arg52のプロトン化状態について検討する



# 計算条件

## ▼ モデル



## ▼ 計算詳細


- high layer: MC\_CAM-B3LYP/6-31+G(d,p)
- middle layer: HF/3-21G
- layering
- low layer: Amber力場 (MM領域の構造は固定)
- 核基底関数系: 1s GTF
- 溶媒効果: CPCM
- NMR計算: GIAO

	high	middle	low	溶媒
ONIOM	Y42,E46,R52,C69,pCA,(I31, T50)*	-	残りの残基	-
ONIOM/PCM	Y42,E46,pCA	I31,T50,R52,C69	残りの残基	PCM

\* Only for protonated model   \*\* main chains are assigned into middle layer

# 結晶構造解析との比較

- ▼ 各条件にGlu46のOH基の  
平衡結合長 ( $R_{eq}$ )  
と振動平均結合長 ( $\langle R \rangle_D$ )



✓  $\langle R \rangle_D > R_{eq}$

→ PESの非調和性を反映


✓ 特にONIOM-DP (脱プロトン化)  
のモデルでOH結合長の伸びしろ  
が大きい

✓ PCMにより水の溶媒効果を  
導入するとDPモデルでも  
大きな結合伸長は起きない

✓ 結晶構造解析に最も近いのは  
脱プロトン化Arg52のモデル(ONIOM-DP)


# 溶液NMRとの比較

▼ 溶液NMRの3つの実験値に着目





# NMR化学シフト、同位体シフト

▼ Tyr42とGlu46の  
 $^1\text{H}$  NMR 化学シフトの差





▼ Tyr42, Glu46それぞれの  
同位体シフト



- ✓ NMRの結果を最も良く再現したのは、  
プロトン化+溶媒効果のモデル (ONIOM/PCM-P)

# 溶媒環境の違いが水素結合様態に影響か？

- ✓ Arg52の脱プロトン化のモデルが  
結晶構造解析の結果を最もよく再現
- ✓ プロトン化のモデル計算がNMRの  
それぞれの同位体シフト実験値を最もよく再現  
→ 両実験条件下ではArg52は  
プロトン化し、LBHBを形成しない
- ✓ 溶媒効果により液相NMRの再現性向上
- ✓ 溶媒効果は大きな結合伸長を阻害  
→ LBHB形成時の静電環境は  
一般的な水溶媒のものとは異なっていることを示唆



	溶液 NMR	結晶 構造解析	発現菌の 生育環境
Arg52	プロトン化	脱プロトン化	?
LBHB形成	×	○	?
pH	7	9	10.5
塩濃度	40mM	1 M	saturating

強電解質  
(誘電率減)

# **V. 生体高分子生化学的機能解析の ための分子計算技術の開発**

# Inside-out アプローチ

1. 金属補欠分子固有の電子構造を調べる (QM)
2. タンパク質中での電子構造を調べる (QM/MM)
3. 1と2を比較する



static effects (構造歪み、静電相互作用)

dynamic effects (ゆらぎ)



半経験的分子軌道法によるQM部分の高速化

+

超並列 *ab initio* QM/MM-MD連成計算プログラム  
Platypusの開発

# V-1. 半経験的分子軌道法による QM部分の高速化

Saito, T.; Kitagawa, Y.; Takano, Y. *J. Phys. Chem. A* **2016**, *120*, 8750–8760.

# QM/MM-MDシミュレーションの 計算コスト

time for QM/MM  
single point calculation / s

600

UDFT/DZP level

size of QM region



number of steps in MD run


e.g.,) 1ns =  $1 \times 10^6$  step

**Provided that every QM/MM energy and force computation takes 10 min.,**

it adds up to the 1,000,000 QM/MM computations

→ **one MD run takes 20 years !!**

# Semiempirical Molecular Orbital (SE-MO) model



e.g.,)  $1\text{ns} = 1 \times 10^6$  step

**1ns MD run requires 70 days.**

M. J. S. Dewar and W. Thiel, *J. Am. Chem. Soc.* 99, 2338 (1977).  
W. Thiel, *WIREs. Comput. Mol. Sci.* 4, 145 (2014).

# SE-MO法の精度

***GMTKN30-CHNOF database  
(430 reactions mostly involving closed-shell molecules)***

L. Goerigk and S. Grimme, *J Chem. Theory Comput.* 6, 107 (2010).  
L. Goerigk and S. Grimme, *Phys. Chem. Chem. Phys.* 13, 6670 (2011).

	MAEs (kcal/mol)*	Supporting TM
MNDO	27.3	No
AM1	14.7	No
PM3	11.3	No
PM6	10.2	YES
OM3	6.3	No


\*mean absolute errors, excluding the MB08-165 subset

P. Dral et al., *J. Chem. Theory Comput.* 12, 1097 (2016).

Given the applicability to a wide range of molecules,  
we chose **PM6**, which supports 70 elements in the periodic  
table.  
J. J. P. Stewart, *J. Mol. Model.* 13, 1173 (2007).


# What about Open-shell Systems ?

- methylene ( ${}^{1,3}\text{CH}_2$ )





bent

H-C-H =  $102.3^\circ$  (singlet)  
=  $134.0^\circ$  (triplet)




linear with the H-C-H angle of  $180^\circ$

- cyclobutadiene ( ${}^1\text{C}_4\text{H}_4$ )



square planar ( $D_{4h}$ )




non-planar

The spin-unrestricted PM6 (UPM6) computation  
**does not work** for open-shell diradical molecules.

# 目的

Our primary purpose is to improve the accuracy of PM6 in describing electronic and geometric structures of **organic open-shell species**, for which a slight modification was made.



The number of optimizable electronic and core–core parameters adds up to 43 (**P**) for the basic elements (H, C, N, O).

# Application to Methylene

(included in the training set)


Method	$^1\text{CH}_2$		$^3\text{CH}_2$		S-T gap [kcal/mol] <sup>a</sup>
	C-H	H-C-H	C-H	H-C-H	
UAM1	1.068	140.6	1.062	151.7	34.1
UPM3	1.067	131.3	1.063	149.9	42.7
UPM6	1.018	180.0	1.019	180.0	31.5
<b>UrPM6</b>	<b>1.081</b>	<b>111.9</b>	<b>1.039</b>	<b>152.6</b>	<b>11.2</b>
UB3LYP/6-31G*	1.090	113.5	1.082	133.1	6.0
Expt.	1.107	102.3	1.077	134.0	9.0

<sup>a</sup> With the AP correction

It is not surprising that the present UrPM6 shows great improvement over the original UPM6.

The standard SE-UMO calculations are likely to provide strong diradical characters that entail the significantly large S-T gaps.

# Application to Heptazethrene Derivative



Z. Sun et al. *J. Am. Chem. Soc.* 133, 11896 (2011).

Method	$\langle S^2 \rangle^{\text{BS}}$	$\langle S^2 \rangle^{\text{HS}}$	S-T gap/ kcal mol <sup>-1</sup>	OS – CS gap/ kcal mol <sup>-1</sup>	CPU time /s (serial mode)
UAM1	3.767	4.027	-14.7	-34.0	
UPM3	3.399	3.604	-13.6	-30.7	
UPM6	2.708	3.190	-11.5	-19.5	
<b>UrPM6</b>	<b>1.591</b>	<b>2.436</b>	<b>-8.1</b>	<b>-6.4</b>	<b>23</b>
UBHandHLYP	1.273	2.254	-8.7	-7.5	> 150 000
UB3LYP	0.355	2.061	-8.0	-0.3	> 150 000


UrPM6 displays similar behavior to UBHandHLYP rather than to UB3LYP, showing a slight exaggeration of diradical character.

# V-2. 超並列 *ab initio* QM/MM-MD 連成計算プログラム Platypus

Takano, Y.; Nakata, K.; Yonezawa, Y.; Nakamura, H. *J. Comput. Chem.* **2016**, 37, 1125–1132.

# 超並列 $ab initio$ QM/MM-MD連成計算プログラム Platypusの開発

(PLATform for dYnamics Protein Unified Simulation)



ダウンロード先 (現在はPlatypus-QMのみ配布)

[http://www.islim.org/islim-dl\\_j.html](http://www.islim.org/islim-dl_j.html)

# 現在までの研究開発成果

- **RDF, UHF, R-DFT, U-DFT, CIS, CIS(D), CIS-DFT, MP2, CASSCF の実装**
- エネルギー・力計算における**積分計算のハイブリッド並列化とSIMD化**
- 2電子積分計算の**原子軌道基底から分子軌道基底への変換部分の高度化**
- CASSCF計算における**direct CI 計算の高速化** (CAS(16,16)まで可能)


➡ **QM部分の高速化・超並列化**

- 粗結合 (**chain-of-state法**)を利用した超並列化

➡ **超並列化されたQM/MD計算による反応自由エネルギー**

# 「京」での並列性能(QM)

並列化率 **99.9888%**



光合成反応中心  
スペシャルペア  
(280原子)


RHF/cc-pVDZ

総数**32,768コア**

並列化率 **99.9888%**

実行効率 7.27～2.24%

(8192コア : 4.26%)




CASCI(16,16)/6-31G\*\*

総数**16,384コア**

並列化率 **99.9728%**


実行効率 15.43～6.80%

(8192コア : 7.85%)



# 「京」での並列性能(QM/MM-MD)

98,304コアのハイブリッド並列の実行



Ace-ALA-NMe  
+  
1,080 水分子

Strong scaling

総数2,048コア

並列化率：99.7893%

実行効率 10.60～1.94%



Weak scaling (Chain of State)

総数98,304コア

128プロセス x 768レプリカ


実行効率 3.42～3.20%

Weak scaling効率：93.36%




# 励起状態QM/MDシミュレーション

## sirius発色団



sirius発色団(1,374原子) QM: 発色団  
SA-CASSCF(8,8)/MINI-4 MM: 水




$\Delta t = 0.25 \text{ fs}$   
120,000ステップ


## 4. まとめ

# Protein as amplifier

- 光合成反応中心のスペシャルペア





- シトクロムc酸化酵素のヘム a in CcO



タンパク質環境の電気的・立体的摂動によって、補欠分子の固有に持つ性質が強められ、制御されている

# 溶媒環境の違いが活性中心を制御



溶液 NMR	結晶 構造解析	発現菌の 生育環境
-----------	------------	--------------

Arg52	プロトン化	脱プロトン化	?
LBHB形成	×	○	?
pH	7	9	10.5
塩濃度	40mM	1 M	saturating

強電解質  
(誘電率減)

タンパク質  
溶媒環境 → 料理人



活性中心 → 包丁

# 共同研究者

## 光合成反応中心

- ・中村 春木 (大阪大)
- ・山崎 秀樹 (大阪大)

## PYP

- ・兼松佑典 (広市大)
- ・立川仁典 (横市大)

## Platypus開発

- ・中村 春木 (大阪大)
- ・中田一人 (NEC)
- ・米澤康滋 (近畿大)
- ・山中秀介 (大阪大)

## rPM6開発

- ・齋藤徹 (広市大)
- ・北河康隆 (大阪大)

# 外部資金

新学術領域「コンピュータイクス」

新学術領域「3D活性サイト科学」



JST-CREST

「ライフサイエンスの革新を目指した  
構造生命科学と先端的基盤技術」



Nakagawa project  
CREST

CREST



「次世代生命体統合シミュレーション  
ソフトウェアの研究開発」